HVC by Anagra

SOILactive

CONSORCIO MICROBIANO

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Soilactive es una formulación líquida que restablece la microbiología de los suelos agotados ayudando a potenciar la fertilidad biológica.
Contiene una diversidad de microorganismos benéficos del suelo a altas concentraciones, que permiten optimizar la nutrición y desarrollo del cultivo mejorando la estructura del suelo, favoreciendo la salud de las plantas desde la raíz.

BENEFICIOS

- ✓ Enriquece la microbiología del suelo.
- ✓ Asegura buena respuesta de las formulaciones microbiológicas aplicadas a la raíz.
- ✓ Mejora la acción preventiva de microorganismos antagónicos contra patógenos que afectan la raíz.
- ✓ Mejora la actividad y desarrollo radicular.
- ✓ Optimiza el estado nutricional del cultivo.
- ✓ El uso de Soilactive contribuye al mejoramiento de la estructura del suelo.
- ✓ Aumenta la productividad del cultivo. De fácil aplicación y manejo.

INGREDIENTES ACTIVOS | CONCENTRACIÓN MÍNIMA

Compuesto	Concentración
Rhizobium leguminisarum	10^9 UFC/ml
Bacillus safensis	10^9 UFC/ml
Bacillus firmus	10^9 UFC/ml
Bacillus Megaterium	10^9 UFC/ml
Trichoderma harzianum	10^8 UFC/ml
Bacillus subtilis	10^9 UFC/ml

Concentración Mínima Garantizada

Bacterias $1x10^9$ufc/mL - Hongos $1x10^8$ufc/mL

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Olor:	Característico
Color:	Característico
pH:	6.0-6.5 a 20°C
Densidad:	1.00 gr/mL a 20°C
Solubilidad en Agua:	100%

Lea completamente la etiqueta antes de usar el producto.
En caso de dudas, consulte con un ingeniero agrónomo o técnico asesor de Anagra.

N° de Lote:
Ver en el envase
Fecha de producción:
Ver en el envase

Anagra®

Distribuido por:
Anagra S.A.
Los Conquistadores 1700 piso 21
Providencia, Santiago, Chile
www.anagra.cl

HVC by Anagra

SOILactive

CONSORCIO MICROBIANO

FICHA TÉCNICA

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis L/ha)	Forma de Aplicación
Frutales de hoja perenne	2- 5	Aplicación en dos parcialidades a partir de "Flush"radicular de primavera, una vez la temperatura promedio del suelo sea mayor o igual a 10°C .
Frutales de hoja caduca	2- 4	Aplicación en dos parcialidades a partir de "Flush"radicular de primavera, una vez la temperatura promedio del suelo sea mayor o igual a 10°C .
Hortalizas	2 - 3	Durante los primeros estadios de desarollo del cultivo en al menos dos parcialidades , en itermitencia de 7 a 10 días con la aplicación de plagicidas y/o herbicidas.
Vivero	1 -1,5 cc/ Planta	El producto puede ser aplicado a traves del riego o en plantines: realizar una solucion madre para sumergir las plantas según la recomendación del equipo técnico.

ALMACENAJE

El producto debe ser conservado bajo temperatura de refrigeración (3 – 10°C), o en su defecto en un ambiente muy frío, a no más allá de 18°C. No provocar golpes de temperatura.

COMPATIBILIDADES

No mezclar con pesticidas (bactericidas, fungicidas, compuestos cúpricos, antibióticos).
Producto de formulación líquida. Periodo de vencimiento: 5 meses a partir de su fecha de elaboración..

IMPORTANTE

- ✓ Mantener bien cerrado
- ✓ Mantener refrigerado
- ✓ Evitar la exposición directa al sol
- ✓ No dejar al alcance de niños
- ✓ No ingerir
- ✓ No inhalar
- ✓ Considerado no peligroso

*Sin acción o aptitud plaguicida.
Producto no autorizado para uso en agricultura orgánica

Lea completamente la etiqueta antes de usar el producto.
En caso de dudas, consulte con un ingeniero agrónomo o técnico asesor de Anagra.

Anagra®
Comercializado por:
Anagra S.A.
Los Conquistadores 1700 piso 21
Providencia, Santiago, Chile
www.anagra.cl